

# QUESTIONARIO DIAGNOSTICO

Variante comportamentale della demenza frontotemporale  
(Behavioural Variant Frontotemporal Degeneration, bvFTD)



## PER LEI: alterazioni del comportamento, dell'umore o della personalità

Spunti ogni casella accanto ai sintomi che Lei o una persona a Lei cara ha manifestato. Porti questo modulo al Suo prossimo appuntamento con un operatore sanitario o chieda se desidera esaminarlo prima della visita. Questo modulo non sostituisce la diagnosi da parte di un professionista medico.

### APATIA

- Perdita di interesse per il lavoro, gli hobby o le relazioni
- Mancanza di attenzione all'igiene personale
- Perdita di iniziativa

### COMPORTAMENTO SOCIALMENTE INACCETTABILE

- Dire inaspettatamente cose maleducate o offensive
- Toccare in modo inopportuno, avere un comportamento sessualmente disinibito e inappropriato o violare lo spazio personale altrui
- Taccheggiare o fare acquisti in modo impulsivo
- Aggressività o agitazione imprevista

### DECLINO NELLE FUNZIONI ESECUTIVE

- Difficoltà di pianificazione
- Difficoltà nella gestione finanziaria e nell'assunzione di decisioni
- Errori ripetuti sul lavoro

### MANCANZA DI DISCERNIMENTO

- Incolpare gli altri delle conseguenze del proprio comportamento
- Manifestare frustrazione o rabbia in conseguenza della consapevolezza delle proprie limitazioni

### COMPORTAMENTO COMPULSIVO


- Ripetere parole o frasi
- Strofinare continuamente o battere le mani
- Rileggere lo stesso libro o guardare lo stesso episodio di un programma televisivo
- Accumulare compulsivamente oggetti o cibo
- Insistere di voler compiere lo stesso percorso ogni giorno per andare in un luogo specifico

### PERDITA DI PREOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI

- Indifferenza a eventi significativi come un decesso o una nascita in famiglia
- Perdita di empatia
- Improvvisa incapacità nel riconoscere le emozioni altrui
- Frequente irritabilità e cambiamenti di umore

### CAMBIAMENTI NELLE ABITUDINI ALIMENTARI

- Alimentazione incontrollabile e/o consumo eccessivo di bevande (alcoliche)
- Mangiare solo cibi specifici
- Aumento o primo consumo di tabacco o alcol
- Tentativo di mangiare oggetti non commestibili



Per avere maggiori informazioni sulla bvFTD, inquadrare il codice QR con lo smartphone o visitare il sito [theaftd.org/what-is-ftd/behavioral-variant-ftd-bvftd](http://theaftd.org/what-is-ftd/behavioral-variant-ftd-bvftd)

**#AskAboutFTD**

# LISTA DI CONTROLLO DIAGNOSTICA

Variante comportamentale della demenza frontotemporale  
(Behavioural Variant Frontotemporal Degeneration, bvFTD)



## PER IL SUO OPERATORE SANITARIO: DIAGNOSTICARE LA bvFTD

- La seguente scheda contiene i criteri diagnostici sviluppati dal Consorzio Internazionale per i criteri della variante comportamentale della FTD (FTDC).
- Per una diagnosi differenziale si raccomanda la consulenza di uno specialista in neurologia cognitiva e comportamentale e/o un neuropsicologo geriatrico.
- **ICD 10 = G31.09** per demenza del lobo frontale con disturbi comportamentali.

**1. Malattia neurodegenerativa.** Per la bvFTD, la persona colpita deve mostrare un deterioramento progressivo del comportamento e/o delle funzioni cognitive mediante osservazione o anamnesi dei sintomi, in base a quanto riportato da un informatore esperto (membri della famiglia, partner di assistenza).

**2. Possible bvFTD.** Devono essere presenti tre dei seguenti sintomi comportamentali/cognitivi per soddisfare i criteri. I sintomi devono essere persistenti o ricorrenti, piuttosto che eventi una tantum o rari.

<input type="checkbox"/> <b>Disinibizione comportamentale precoce</b> (deve essere presente uno dei tre sintomi)	1. Comportamento socialmente inappropriato 2. Perdita di buone maniere e riconoscimento del decoro 3. Azioni impulsive, avventate o imprudenti
<input type="checkbox"/> <b>Apatia o inerzia precoce</b> (deve essere presente un sintomo)	1. Apatia 2. Inerzia
<input type="checkbox"/> <b>Perdita precoce di simpatia o empatia</b> (deve essere presente un sintomo)	1. Diminuzione della risposta alle esigenze e ai sentimenti delle altre persone 2. Diminuzione dell'interesse sociale, delle interconnessioni o del calore personale
<input type="checkbox"/> <b>Comportamento conservativo, stereotipato o compulsivo precoce</b> (deve essere presente uno dei tre sintomi)	1. Movimenti ripetitivi semplici 2. Comportamenti complessi, compulsivi o ritualistici 3. Stereotipia del linguaggio
<input type="checkbox"/> <b>Iperoralità e cambiamenti nella dieta</b> (deve essere presente uno dei tre sintomi)	1. Alterazione delle preferenze alimentari 2. Alimentazione incontrollata, aumento del consumo di alcol o sigarette 3. Esplorazione orale o consumo di oggetti non commestibili
<input type="checkbox"/> <b>Deficit delle funzioni esecutive/generative con relativo risparmio di memoria delle funzioni visuospatiali</b> (devono essere presenti tutti e tre i sintomi)	1. Deficit nelle azioni esecutive 2. Risparmio relativo della memoria episodica 3. Risparmio relativo delle competenze visuospatiali

**3. Probabile bvFTD** – Viene diagnosticata quando tutti i seguenti sintomi sono soddisfatti in base ai criteri per bvFTD.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soddisfa i criteri per possibile bvFTD (sezione 2)   | <input type="checkbox"/> Risultati di diagnostica per immagini cerebrale che presentano caratteristiche della bvFTD  |
| <input type="checkbox"/> Mostra un declino funzionale significativo (verificato da un partner di assistenza o dai punteggi della Scala di valutazione clinica della demenza o del Questionario sulle attività funzionali) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Atrofia temporale frontale e/o anteriore presente nella RM o nella TC; oppure</li><li>• Ipoperfusione temporale frontale e/o anteriore o ipometabolismo presenti nella diagnostica per immagini di PET o SPECT</li></ul> |

**4. Criteri di esclusione per la bvFTD.** I criteri 'a' e 'b' devono essere negativi per una diagnosi di bvFTD, mentre 'c' può essere positivo per una possibile bvFTD e negativo per una probabile bvFTD.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| a. Il modello di deficit è meglio rappresentato da altri disturbi non degenerativi del sistema nervoso o medici | b. Il disturbo del modello comportamentale è meglio rappresentato da una diagnosi psichiatrica | c. Biomarcatori fortemente indicativi di malattia di Alzheimer o altro processo neurodegenerativo |
|---|--|---|

Rascovsky, K, Hodges, JR, Knopman, D, Mendez, MF, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain 2011 Sept; 134:2456 – 2477.



Per ulteriori indicazioni diagnostiche, inquadrare il codice QR con lo smartphone o visitare il sito [theaftd.org/for-health-professionals/diagnosing-ftd](http://theaftd.org/for-health-professionals/diagnosing-ftd)

© 2023 The Association for Frontotemporal Degeneration