

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO



## Afasia progresiva primaria (APP)

### PARA USTED: Problemas para hablar, entender, leer o escribir


Marque cada síntoma que usted o un ser querido hayan experimentado. Lleve este formulario a su próxima cita con un proveedor de atención médica o pregúntele si quisiera revisarlo antes de su visita.

#### HABLA LENTA Y LABORIOSA

- Dificultad para mover los labios y la lengua para hablar (lo que da lugar a un habla lenta y laboriosa y a una mala pronunciación)
- Omitir palabras al formar una oración, especialmente conectores cortos (es decir, “a”, “de”, “el”, “y”)
- Ordenar palabras en oraciones de forma incorrecta; usar terminaciones de palabras, tiempos verbales o pronombres incorrectos
- Pausas y vacilaciones al hablar y descripciones extensas para explicar las palabras que faltan
- Hablar de manera inusual en oraciones más cortas y simples
- Reemplazar sustantivos con palabras vacías como “cosa”
- Problemas para entender oraciones complejas
- Errores en los sonidos del habla, como omitir o sustituir ciertos sonidos (por ejemplo: sustituir un sonido “t” por un sonido “g”; decir “tas” en lugar de “gas”)

#### DIFICULTAD PARA NOMBRAR PERSONAS Y OBJETOS

- Problemas para recordar los nombres de los objetos (esto también puede incluir sustituir un nombre por otra palabra similar, como utilizar “automóvil” en lugar de “camión”).
- Hablar con facilidad, pero no tener sentido para el oyente
- No poder identificar nombres de objetos familiares
- No poder identificar cómo se utiliza un objeto familiar
- Dificultades para leer y escribir palabras que no se pronuncian como se escriben (como escribir “ola” en lugar de “hola”)




Si desea obtener más información sobre la APP, escanee el código QR con su teléfono inteligente o visite [theaftd.org/what-is-ftd/primary-progressive-aphasia/](https://theaftd.org/what-is-ftd/primary-progressive-aphasia/)

**#AskAboutFTD**

### PARA SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA: DIAGNÓSTICO de APP

A continuación, presentamos los criterios diagnósticos para la APP. Se recomienda la derivación a un neurólogo especializado en cognición y comportamiento o a un neuropsicólogo geriátrico para un diagnóstico diferencial. CIE 10 = G31.01 para la afasia progresiva primaria.

Para obtener más orientación de diagnóstico, escanee el código QR con su teléfono inteligente o visite [theaftd.org/for-health-professionals/diagnosing-ftd/](http://theaftd.org/for-health-professionals/diagnosing-ftd/)



#### 1. Criterios de inclusión/exclusión para el diagnóstico de APP – Las personas que cumplen con los criterios pueden ser evaluadas para diagnosticar una variante específica de APP.

<b>Criterios de inclusión</b> <i>(todos los criterios deben ser positivos)</i>	<input type="checkbox"/> Dificultad progresiva gradual del lenguaje <input type="checkbox"/> La característica clínica más destacada es la dificultad con el lenguaje <input type="checkbox"/> Los déficit de lenguaje son la causa principal del deterioro de las actividades de la vida diaria <input type="checkbox"/> La afasia es el déficit más prominente en el inicio de los síntomas y durante las etapas iniciales
<b>Criterios de exclusión</b> <i>(todos los criterios deben ser negativos)</i>	<input type="checkbox"/> El patrón de déficit se explica mejor mediante otros trastornos nerviosos o médicos no degenerativos <input type="checkbox"/> Las alteraciones cognitivas se explican mejor mediante un diagnóstico psiquiátrico <input type="checkbox"/> Deterioro inicial prominente de la memoria visuoperceptual, la memoria visual y la memoria episódica <input type="checkbox"/> Alteraciones iniciales prominentes del comportamiento

#### 2. Diagnóstico clínico de variantes de APP

<b>APP no fluente/agramatical</b>	<input type="checkbox"/> Agramatismo en la producción lingüística <input type="checkbox"/> Habla esforzada y vacilante, errores inconsistentes de sonido del habla (apraxia verbal) <input type="checkbox"/> Comprensión deficiente de oraciones sintácticamente complejas <input type="checkbox"/> Comprensión de palabras sueltas preservada <input type="checkbox"/> Conocimiento de objetos preservado
<b>APP logopéica</b>	<input type="checkbox"/> Deterioro en la recuperación de palabras sueltas en el habla espontánea y en la denominación <input type="checkbox"/> Deterioro en la repetición de palabras y frases <input type="checkbox"/> Errores fonológicos en el habla espontánea y la denominación <input type="checkbox"/> Comprensión en el habla espontánea y conocimiento de objetos preservados <input type="checkbox"/> Habla preservada a nivel motor <input type="checkbox"/> Ausencia de agramatismo franco
<b>APP variante semántica</b>	<input type="checkbox"/> Deterioro de la denominación de confrontación <input type="checkbox"/> Deterioro de la comprensión de palabras sueltas <input type="checkbox"/> Deterioro del conocimiento de los objetos, especialmente de los artículos poco frecuentes o poco familiares <input type="checkbox"/> Dislexia superficial o disgrafía <input type="checkbox"/> Rislexia superficial o disgrafía <input type="checkbox"/> Producción del habla preservada

#### 3. Diagnóstico por imágenes de las variantes de APP – se debe observar uno de los criterios de las imágenes además de un diagnóstico clínico.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cumple con los criterios para APP<br><input type="checkbox"/> Presenta un deterioro funcional significativo (verificado por un cuidador o por los puntajes de la Escala de Calificación de Demencia Clínica o el Cuestionario de Actividades Funcionales) | <input type="checkbox"/> Resultados de las imágenes cerebrales que presentan características de DFTvc <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atrofia temporal frontal o anterior presente en imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada; o</li> <li>• Hipoperfusión o hipometabolismo temporal frontal o anterior presente en imágenes PET o SPECT</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Diagnóstico de las variantes de APP con patología definida – para todas las variantes de APP, se debe cumplir uno de los dos criterios patológicos complementarios, además de un diagnóstico clínico.

- Presencia de una mutación patogénica conocida
- Evidencia histopatológica de una patología neurodegenerativa específica (demencia frontotemporal [DFT] o enfermedad de Alzheimer [EA])